

Noshornsbagge

Den fullbildade noshornsbaggen är omisskännlig. Hanen blir upp mot 4 cm lång, har ett långt böjt huvudhorn som påminner om noshörningars horn. Honan är nästan lika stor men i stället för ett horn har hon en knöl.

Larven av noshornsbaggen, *Oryctes nasicornis*, har ursprungligen sannolikt varit trädlevande, men för ett par hundra år sedan fick den utmärkta utvecklingsmöjligheter i sågspånshögar vid sågverk.

Sågspånshögarna blev sedan alltmer sällsynta varför arten fick ändra sina levnadsförhållanden. Numer förekommer de främst i gödselstackar och lövkomposter, där de kan finnas i stor mängd.

Den fullbildade skalbaggen kan påträffas under en stor del av året men den kan vara svår att upptäcka eftersom den främst är nattaktiv. Svärmningen sker under veckorna runt midsommar, och honorna lägger cirka 40 ägg.

Larvutvecklingen tar 3-5 år. Den fullvuxna larven blir ungefär 10 cm lång, och förpuppningen sker i en stor kokong.

Noshornsbyggarna har hos oss blivit allt vanligare i senare tid, den finns utbredd från Skåne till Norrbotten.



Larv nyligen plockad från gödselstacken.

Efter bara någon minut söker den sig ner i gödseln.



Hanne med horn. Även den färdiga skalbaggen gräver ner sig i gödseln efter någon minut.